

NATECAL. COMPOSICIÓN. Cada comprimido masticable contiene: Carbonato cálcico (D.C.I.), 1.500 mg (equivalente a 600 mg de calcio) y Colecalciferol (vitamina D3) 400UI; Excipientes: Aspartamo (E951); Sacarina sódica; Sorbitol; Lactosa; Croscarmelosa sódica; Estearato de magnesio; Esencia de anís; Esencia de menta; Esencia de melaza; Maltodextrinas, c.s. **FORMA FARMACÉUTICA Y CONTENIDO DEL ENVASE.** Envase de 60 comprimidos masticables. **ACTIVIDAD** Natecal D es una asociación a dosis fijas de Calcio y Vitamina D. La Vitamina D interviene en la regulación del metabolismo del calcio y del fósforo, aumentando su absorción a nivel intestinal y su asimilación a nivel óseo. **INDICACIONES.** Tratamiento de los estados carenciales de vitamina D en pacientes que necesitan aporte de calcio. Suplemento de vitamina D y calcio asociado a ciertos tratamientos de la osteoporosis. **CONTRAINDICACIONES.** Hipersensibilidad a alguno de los componentes. Hipercalcemia o hipercalciuria (Niveles de calcio superiores a los normales en plasma u orina). Cálculos renales cálcicos. **PRECAUCIONES.** Durante los tratamientos prolongados con Natecal D debería controlarse el nivel de calcio en orina y reducir o interrumpir momentáneamente el tratamiento si este supera los 7,5 mmol/24 h (300 mg/24 h). En ancianos se recomienda controlar regularmente la función renal. Deberá calcularse la ingesta diaria total de vitamina D cuando se estén administrando simultáneamente otros tratamientos que contengan esta vitamina. Natecal D deberá ser administrado con precaución en aquellos pacientes afectos de sarcoidosis. En pacientes con insuficiencia renal, por presentar una alteración del metabolismo de la vitamina D, deberá realizarse un estricto control del balance fosfo-cálcico. **INTERACCIONES.** Informe a su médico si está tomando otros medicamentos debido a que se pueden producir las siguientes interacciones: La administración de Natecal D, al igual que otros preparados de calcio, puede reducir la absorción de las tetraciclinas. Deberá respetarse un intervalo de al menos 3 horas entre la administración de ambos fármacos. La administración conjunta de Natecal D con bifosfonatos o fluoruro de sodio puede reducir la absorción de éstos por lo que debería espaciarse la administración al menos dos horas. Los anticonvulsivantes y barbitúricos pueden acelerar la metabolización de la vitamina D, reduciendo su eficacia. En asociación con digitálicos, se pueden potenciar los efectos tóxicos de éstos, debiendo seguirse un NATECAL D Comprimidos Masticables estricto control clínico. Asociado con los diuréticos tiazídicos existe riesgo de hipercalcemia por disminución de la eliminación urinaria del calcio. Pueden aparecer interferencias diagnósticas con las determinaciones

analíticas de fosfatos, calcio, magnesio, colesterol y fosfatasa alcalina. **ADVERTENCIAS.** Advertencias sobre excipientes. Esta especialidad contiene como excipiente aspartamo. Las personas afectadas de fenilcetonuria tendrán en cuenta que cada unidad de dosis contiene 2,75 mg de fenilalanina. Uso en embarazo y lactancia. Si está embarazada o en período de lactancia, consulte a su médico antes de tomar este medicamento, dado que la dosis máxima en este caso no debe ser superior a 1 comprimido diario. Efectos sobre la capacidad para conducir vehículos y utilizar maquinaria. No se han descrito. **POSOLOGÍA.** Adultos: 1-2 comprimidos masticables al día, preferentemente después de las comidas. Niños: consultar al médico para individualizar la dosis. **INSTRUCCIONES PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN DEL PREPARADO.** Masticar bien los comprimidos antes de tragarlos, ingiriendo a continuación un vaso de agua. **SOBREDOSIS.** En caso de sobredosis o ingestión masiva accidental, consultar al servicio de Información Toxicológica. Una sobredosificación prolongada podría producir los siguientes signos y síntomas clínicos y de laboratorio: anorexia, náuseas, vómitos, poliuria, depósitos de calcio en los tejidos blandos, hipercalcemia e hipercalciuria. El tratamiento de la sobredosis consiste en interrumpir el tratamiento y rehidratar al paciente. **REACCIONES ADVERSAS.** Ocasionalmente ligeras alteraciones digestivas. NATECAL D puede estimular la formación de cálculos renales en aquellos pacientes con la función renal alterada. **CADUCIDAD.** Este medicamento no se debe utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el envase. Los medicamentos deben mantenerse fuera del alcance y de la vista de los niños.